

## 液体のかぜ薬

[葛根湯濃縮液製剤]

第2類医薬品

### カコナミン内服液S

ケースは本剤とともに保管し、服用の際には必ずお読みください。

#### △【使用上の注意】

##### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)  
短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

##### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害  
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症 状            |
|-------|----------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 消 化 器 | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称           | 症 状                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つばり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。     |
| 肝機能障害           | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 【用法・用量】

次の量を、食間によく振ってから服用してください。

| 年 齢       | 1回量        | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 成人(15歳以上) | 1本         | 3回     |
| 15歳未満     | 服用しないでください |        |

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 本剤は、本質的に沈殿を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 配置期限(ケース及びビンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
- ビンをあけたら飲みきってください。
- ビンをあけたまま保存しないでください。

#### 【お問い合わせ先】

新生薬品工業株式会社

電話番号 0744-52-3330

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 新生薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1269

30mL×3本入(3回分) ¥1,350+税

30mL×3本

