

配置用

全てのかぜ症状に よく効く 独自処方

※かぜの11症状



鼻水・鼻づまり

クレマスチンフマル酸塩
ペラドンナ総アルカロイド

せき・たん

ブロムヘキシシン塩酸塩

のどの痛み

トラネキサム酸

鼻水、鼻づまり、せき、たん、のどの痛みに

セルフメディケーション
税控除対象
第2類医薬品

新ルル[®]S 細粒

- 鼻水・鼻づまりには<クレマスチンフマル酸塩>、<ペラドンナ総アルカロイド>がダブルで効き目を発揮します。
- 去たん成分<ブロムヘキシシン塩酸塩>が、せきの原因となるたんを出しやすくします。
- 抗炎症成分<トラネキサム酸>が、のどの痛みにすぐれた効き目を発揮します。
- サッと溶ける細粒剤で、分包なので持ち歩きにも便利です。



第一三共ヘルスケア



新ルル[®]S 細粒

セルフメディケーション
税 控除 対象
第2類医薬品



新ルルS 細粒の特徴

かぜのつらい3大症状（鼻症状、せき・たん、のどの痛み）にすぐれた効き目を持つ4種の成分（クレマスチンフマル酸塩、ペラドンナ総アルカロイド、プロムヘキシジン塩酸塩、トラネキサム酸）等を配合した総合かぜ薬です。

1. かぜの11症状すべてにすぐれた効き目を発揮する、ご家庭の常備薬として適したかぜ薬です。
2. 鼻水・鼻づまりには持続性抗ヒスタミン成分 クレマスチンフマル酸塩、副交感神経遮断成分 ペラドンナ総アルカロイドがダブルで効果を発揮します。
3. プロムヘキシジン塩酸塩がせきの原因となるたんを出しやすくします。
4. 抗炎症成分 トラネキサム酸と解熱鎮痛成分 アセトアミノフェンの作用で、のどの痛み、発熱などにすぐれた効き目を発揮します。
5. サツと溶ける細かい粒でスーッとした服用感の細粒剤です。分包なので携帯にも便利です。

■ 効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、せき、たん、のどの痛み、発熱、悪寒、頭痛、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

■ 用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人（15 歳 以 上 ）	1 包	3 回 食後なるべく 30 分以内に服用して下さい。
12 歳 以 上 15 歳 未 満	$\frac{2}{3}$ 包	
12 歳 未 満	服用しないで下さい。	

（用法・用量に関連する注意）

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 12 歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

■ 成分・分量

本剤は、白色～微黄白色の細粒で、3包（1包 1.2g）中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	は た ら き
クレマスチンフマル酸塩	1.34mg	かぜのアレルギー症状（鼻水、くしゃみ等）を持続的におさえます。
ペラドンナ総アルカロイド	0.3mg	鼻水をおさえます。
プロムヘキシジン塩酸塩	12 mg	せきの原因の1つであるたんを出しやすくします。
トラネキサム酸	420mg	炎症のもと【プラスミン】をおさえ、のどのはれや痛みをしずめます。
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛みをやわらげます。
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
ジヒドロクロコチンリン酸塩	24mg	せき中枢にはたらき、せきをしずめます。
無水カフェイン	60mg	頭痛をやわらげます。
ベンゾチアミン （ビタミンB ₁ 誘導体）	24mg	かぜによって消耗した体力の回復を促します。

添加物：D-マンニトール、トウモロコシデンプン、カルメロースCa、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、I-メントール

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

〈お問い合わせ先〉 第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日、当社休日を除く）



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

本冊子は環境にやさしいインクを使用し印刷しています。

製造販売元
DAITO 日イト 株式会社
富山県富山市八日町326番地



ご用命は

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないで下さい。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
(3) 12 歳未満の小児
(4) フェニルケトン尿症の人（本剤はL-フェニルアラニン化合物を含んでいます）
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬、トラネキサム酸を含有する内服薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります）
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
5. 服用前後は飲酒しないで下さい。
6. 長期連用しないで下さい。

⚠ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
(6) 次の診断を受けた人
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、血拴のある人（脳血拴、心筋梗塞、血栓性静脈炎等）、血拴症を起こすおそれのある人、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい、興奮、けいれん、頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下、顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 （ステevens-Johnson症候群）、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしただけで息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
便秘、口のかわき、眠気、目のかすみ
4. 5~6 回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。



Daiichi-Sankyo

鼻水、鼻づまり、せき、たん、のどの痛みに

第2類医薬品


新ナルル[®]S 細粒

製品ご説明資料


- 1.かぜ薬と聞いて思い浮かぶブランド**
- 2.基本コンセプト**
- 3.かぜ薬に関する生活者実態**
- 4.新ルルS細粒の製品特長**



かぜ薬を購入される方が、購入時**最も重視する点**は「**効果が高い**」こと。
治療（症状緩和）を目的に使用される為、効き目の良さという点も重要です。




同じ家族の中でも、かぜに罹った時の症状は実に様々。特定症状のみならず、**かぜの4大症状「熱」「のど」「はな」「せき・たん」**にしっかりと効果を発揮する処方設計を実現。



イメージ図

症状別経験率・対処法（かぜ薬ユーザー）




第一三共ヘルスケア調べ（2016年）


同じ家族の中でも、かぜに罹った時の症状は実に様々。特定症状のみならず、**かぜの4大症状「熱」「のど」「はな」「せき・たん」**にしっかりと効果を発揮する処方設計を実現。

症状	成分	成人1日量	はたらき
熱	アセトアミノフェン	900 mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛みをやわらげます
のど	トラネキサム酸	420 mg	炎症のもと【プラスミン】を抑え、のどのはれや痛みをしずめます
はな	クレマスチンフマル酸塩	1.34mg	かぜのアレルギー症状（鼻水、くしゃみ等）を持続的におさえます
	ベラドンナ総アルカロイド	0.3mg	鼻水をおさえます
せき・たん	ブロムヘキシン塩酸塩	12 mg	せきの原因であるたんを出しやすくします
	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60 mg	気管支をひろげ、せきをしずめます
	ジヒドロコデイン酸塩	24 mg	せき中枢に働き、せきをしずめます
頭痛	無水カフェイン	60 mg	頭痛をやわらげます
滋養	ベンフォチアミン	24 mg	かぜによって消耗した体力の回復を促します

かぜの原因の90%はウイルス感染。ウイルスの感染により炎症反応が生じ、それに伴って、のどの痛み、鼻水などの上気道症状が現れます。また、ウイルスなどを体外に排出するために、せき・たんなどの症状を伴うことも多く、発熱や頭痛などの全身症状も現れます。




イメージ図





イメージ図

ルルS細粒に配合されている成分「トラネキサム酸」が、感染により増加した炎症の元である「プラスミン」の発生を抑制。そのはたらきにより、炎症症状が改善します。




有効成分
「トラネキサム酸」



ルルス細粒投与群に於いて、有意に炎症を抑制


⇒のどの痛みを始めとして、かぜ症状の原因に優れた効果を発揮！！

●抗炎症作用試験結果「ラット足浮腫モデル試験」



* $P < 0.05$
** $P < 0.01$

持続性抗ヒスタミン剤 「クレマスチンフマル酸塩」



1. 強力な抗アレルギー作用を有する

代表的な抗ヒスタミン剤であるクロルフェニラミンマレイン酸塩と比較すると抗ヒスタミン作用で10倍、毛細血管透過性で6倍強力であることが認められている（動物実験）

2. 持続した効果が期待出来る

人上膊部内側にヒスタミン有利物質を皮内注射して誘発した紅斑及び膨疹に対する本剤の抑制効果を検討した成績により、
10～12時間持続することが認められている

3. ねむけ・口渇などの副作用が少ない

強力で持続的な抗アレルギー作用を有する反面、鎮静ないし自律神経系への影響が少ない。


抗コリン薬 「ベラドンナ総アルカロイド」

ベラドンナは、別名セイヨウハシリドコロとも呼ばれるナス科の草本で、その根茎や根に、副交感神経系の働きを抑える作用を示すアルカロイドを豊富に含んでいる。

ベラドンナから抽出されたアルカロイド成分が副交感神経の働きを抑え、鼻水・涙液の分泌を減少させる（鼻水や涙目を和らげる）。



ベラドンナ（学名：Atropa bella-donna）
ナス科の多年草




ベラドンナ総アルカロイドの主成分

-  **アトロピン** 副交感神経を遮断く抗コリン作用し、鼻水・鼻づまりを軽減します。
-  **スコポラミン**
-  **アセチルコリン**

※イメージ図

ルルS細粒投与群に於いて、有意に鼻汁を抑制
⇒鼻症状（鼻水）に対しても優れた効果を発揮！！


●鼻汁抑制試験結果「モルモット鼻汁抑制モデル試験」




ルルS細粒 処方群において有意に鼻汁分泌を抑制

ルルS細粒投与群に於いて、有意に鼻腔抵抗を抑制
⇒鼻症状（鼻づまり）に対しても優れた効果を発揮！！

●鼻腔抵抗抑制試験結果「モルモットモデル試験」



新ルルAゴールドDX処方群において有意差有

剤型	微粒 	細粒 	顆粒 
長所	溶けやすい	溶けやすい サラッとしている	コーティング可能
短所	口中・のどにひっつく 飛び散りやすい	飛び散りやすい	ザラつく 溶けにくい

一般的な粉薬⇒錠剤に比べ吸収が早いけど、ニガイ、マズイ

ルルの細粒：吸収が早く、クールな服用感

ルルS細粒の特長は
サラッとしている細粒、
メントール配合による服用感の良さ

新ルルS細粒 パブロン 比較表

区分	指定第2類医薬品	指定第2類医薬品	指定第2類医薬品
品 名	新ルルS細粒	パブロンSα微粒 【2025年1月製造品で終売】	パブロンSゴールドW微粒
写 真			
剤 型	細粒	微粒	微粒
包装形態	4方シール 分包品	4方シール 分包品	4方シール 分包品
製造販売元	発売元：第一三共ヘルスケア(株) 製造販売元：ダイト(株)	大正製薬(株)	大正製薬(株)
配置期限	5年	3年	3年
販売価格 (税抜)	8包：1,450円 1包単価：181円/包	8包：1,450円 1包単価：181円/包	12包：1,540円 1包単価：128円/包
1日単価	544円/日	544円/日	385円/日
服用容量	1回1包・3回/日 (3包中)	1回1包・3回/日 (3包中)	1回1包・3回/日 (3包中)
有効成分数	9	8	6
ベンゾアチアミン	24	-	-
アセトアミノフェン	900	900	900
ジヒドロコデインリン酸塩 (麻薬成分)	24	-	24
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60	60	-
無水カフェイン	60	75	-
クレマスチンフマル塩酸	1.34	-	-
ペラドンナ総アルカロイド	0.3	-	-
ブロムヘキシン塩酸塩	12	12	-
トラネキサム酸	420	-	-
デキストロメトルファン	-	48	-
マレイン酸カルビノキサミン	-	7.5	-
ビスイブチアミン	-	24	-
リボフラビン	-	12	12
マレイン酸カルビノキサミン	-	-	-
アスコルビン酸カルシウム	-	-	-
アンブロキシール塩酸塩	-	-	45
L-カルボシステイン	-	-	750
クロルフェニラミンマレイン酸塩	-	-	7.5